Facteurs de risque non compris dans le score de Framingham

Facteurs de risque non compris dans le score de Framingham

Le score sousévalue le risque de MCV en présence de :

Marqueurs mesurables

- Protéine C réactive (PCR) > 2,0 mg/L
- Ratio taille-hanches ≥ 0,85 (femme) ou ≥ 0,90 homme
- Altération de la glycémie à jeun (prédiabète, syndrome métabolique)
- Hypertrophie ventriculaire gauche ou autres anomalies de l'ECG

Profil et histoire médicale

- Ethnicité
- Stigmates de dyslipidémie
- Antécédents de maladies cardiovasculaires précoces parmi les membres de la famille immédiate : hommes ≤ 55 ans et femmes ≤ 65 ans.
- Antécédents familiaux de dyslipidémie
- Néphropathie chronique (DFGe ≤ 60 mL/min/1,73 m2 ou RAC ≥ 3 mg/mmol)
- Obésité (IMC ≥ 30 kg/m2)
- Maladies inflammatoires (polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux, arthrite psoriasique, spondylite ankylosante, maladie inflammatoire de l'intestin)
- Infection par le VIH
- Dysfonction érectile
- Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)

Le score surévalue le risque de MCV en présence de :

Marqueur mesurable

CAC = 0 unité Agatston (UA)

Plateforme en transfert de connaissances Coeur-Poumons-Métabolisme © 2022