

Statines administrées aux doses maximales tolérées

Statines administrées aux doses maximales tolérées			
Si LDL \geq 1,8 mmol/L ou si ApoB \geq 0,70 g/L ou si non-HDL \geq 2,4 mmol/L			
Inhibiteur du PCSK9	Ézétimibe \pm Inhibiteur PCSK9	Inhibiteur PCSK9 \pm Ézétimibe	Icosapent éthyl
Événement coronarien récent Athérosclérose clinique et l'un des problèmes de santé suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Diabète et syndrome métabolique • Maladies multivasculaires • Maladie artérielle périphérique • Infarctus du myocarde Problèmes de santé notamment dans les 2 dernières années <ul style="list-style-type: none"> • Pontage coronarien • LDL \geq 2,6 mmol/L ou hypercholestérolémie familiale • Lp(a) 120 nmol/L 	LDL 1,8 à 2,2 mmol/L ou Non-HDL 2,4 à 2,9 mmol/L ou ApoB 0,7 à 0,8 g/L	LDL \geq 2,2 mmol/L ou Non-HDL \geq 2,9 mmol/L ou ApoB $>$ 0,80 g/L	TG Entre 1,5 à 5,6 mmol/L
Inhibiteur PCSK9 seul			
LDL $>$ 2,2 mmol/L Non-HDL $>$ 2,9 mmol/L ApoB $>$ 0,8 g/L			
Inhibiteur PCSK9 seul			
TG \geq 1,5 mmol/L			