



PROFESSIONNEL À AVISER SI:

DYSPHAGIE

PAB

- Changements aux textures/consistances servies
- Recommandations à l'alimentation : comportement, positionnement, techniques compensatoires

Infirmière et Infirmière auxiliaire

- Initiation ou révision du plan de traitement en dysphagie
- Évolution de la condition
- Manifestation suggérant un risque d'étouffement
- Adaptation RX nécessaire
- Intolérance aux aliments servis
- Alimentation faible ou insuffisante
- Exercices particuliers à promouvoir

Équipe médicale

- Évaluations des intervenants faites et conclusions
- Détérioration de la condition
- Difficulté respiratoire ou aspiration suspectée

Ergothérapeute

- Exacerbation des signes/symptômes de dysphagie (si déjà au dossier)
- Problématique nouvelle ou jamais évaluée par ergo ou ortho
- Positionnement affectant la sécurité, l'autonomie ou confort à l'alimentation
- Difficultés cognitives, d'éveil ou de comportement qui provoquent des signes ou symptômes de dysphagie

Nutritionniste

- Signes et symptômes de dysphagie avec aliments servis
- Usager qui refuse les aliments ou s'alimente peu
- Usager rapporte avoir des aliments adaptés à son domicile
- Exacerbation des signes/symptômes de dysphagie

Orthophoniste

- Présence d'une trachéotomie, d'une atteinte de la voix ou d'un trouble d'élocution
- Exacerbation des signes/symptômes de dysphagie (si déjà au dossier)
- Problématique nouvelle ou jamais évaluée ortho/ergo

Pharmacien

- Les médicaments servis ne sont pas compatibles avec le plan d'adaptation texture/consistance ou voie d'alimentation
- Altération de l'état de conscience avec prise de médicaments multiples

Physiothérapeute

- Usager n'utilise pas une technique de toux/dégagements adaptée
- Embarras bronchique avec difficulté à expectorer non soulagée par interventions standards

Technicienne en diététique

- Usager refuse les aliments ou s'alimente peu
- Usager réclame plus d'aliments ou certains aliments
- Usager rapporte avoir des aliments adaptés à son domicile

SIGNES ET SYMPTÔMES DE DYSPHAGIE

Être alerte aux signes observables pendant ou après les repas

- **Toux** lors du repas ou après le repas (anormale)
- Des **raclements** de gorge fréquents lors de l'alimentation
- Un **changement de voix** lors de l'alimentation (voix enrouée ou mouillée)
- La sensation de résidus ou de **blocage** au niveau de la gorge ou du thorax
- Écoulement de salive, de liquide ou de nourriture hors de la bouche
- La nécessité de recracher des aliments
- Douleur ou difficulté lors de la déglutition
- Reflux nasal
- Présence d'aliments dans les sécrétions pulmonaires