



PROFESSIONNEL À AVISER SI :

PRÉVENTION DU DÉCLIN FONCTIONNEL, PERTE D'AUTONOMIE, CHUTES

PAB

- Changement dans les consignes pour l'aide à l'utilisateur (transfert/déplacement/alarme/soutien AVQ)
- Objectifs à atteindre pour le départ de l'utilisateur
- Instauration d'un plan de réadaptation
- Changement de la condition physique et cognitive de l'utilisateur

Infirmière et infirmière auxiliaire

- Instauration d'un plan pour la prévention ou pour la réadaptation
- Modification de la condition physique ou mentale
- Chute

Équipe médicale

- Évaluations des intervenants faites
- Détérioration de la condition
- Orientation pour le RAD (conclusions)

Équipe consultante en gériatrie

- Usager (65 ans et plus) avec profil gériatrique pour qui les problématiques gériatriques persistent malgré l'intervention interdisciplinaire de l'équipe traitante (voir requête de service)

Infirmière en gériatrie

- Usager de 75 ans et plus avec une fragilité cognitive (TNC connu ou suspecté), à risque de délirium ou cas complexe

Ergothérapeute

- Décalage entre l'autonomie antérieure et actuelle aux AVQs/AVDs
- Limites dans les AVQs/AVDs en lien avec des difficultés physiques, cognitives et/ou de comportements
- Risque de blessure pour le personnel lors des mobilisations
- Positionnement au fauteuil/lit problématique

Infirmière de liaison

- Nécessité de soins infirmiers au RAD /ou référence en réadaptation

Inhalothérapeute

- Difficulté au niveau de la manipulation/utilisation du traitement respiratoire (médication inhalée/ appareillage respiratoire)

Nutritionniste

- Dépistage positif de la malnutrition
- Situation de santé qui augmente les besoins énergétiques/protéiques (plaie, infection importante, cancer, chx récente, etc.)

Orthophoniste

- Difficulté de communication limitant l'autonomie ou le confort

Pharmacien

- Besoin d'une évaluation de la médication pouvant contribuer au risque de chute/perte d'autonomie
- Nécessité d'optimiser la prise de RX
- Préparation d'un PAAM nécessaire

Physiothérapeute / Technologue en physiothérapie

- Décalage entre l'autonomie antérieure et actuelle (transferts, déplacements, accessoire de marche)
- Risque de blessure pour le personnel lors des mobilisations
- Chute ou risque de chute

Technicienne en éducation spécialisée

- Nécessité de réapprentissage ou d'adaptation des modes de fonctionnement en situation complexe (trouble de santé mental, trouble cognitif/délirium, etc.)

Technicienne en nutrition

- Usager s'alimente moins ou peu
- Usager a besoin d'aide à l'alimentation (sera inscrit sur le menu)
- Usager a besoin d'aliments préparés en cuisine (beurré, coupé, etc.)

Travailleuse sociale

- Enjeux psychosociaux associés (épuisement ou absence de proches aidants, RAD compromis selon éval multi)